

DRAINAGE D'UNE COLLECTION DU SINUS FRONTAL PAR VOIE ENDOSCOPIQUE ET OPÉRATION DE DRAF

Cher patient,

Bienvenue au Service d'oto-rhino-laryngologie des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Vous allez bientôt bénéficier d'un drainage d'une collection du sinus frontal par voie endoscopique et opération de Draf.

Cette brochure vous donne de plus amples informations sur cette intervention et sur votre préparation à celle-ci.

Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser au médecin ou à l'infirmière.

Votre rendez-vous (à compléter par vos soins)

Date:

Heure:

Lieu:

INFORMATIONS

DÉPARTEMENT DE NEUROPSYCHIATRIE
ET PATHOLOGIES SPÉCIALES

SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
UNITÉ DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
ET DE RHINOLOGIE

CONSULTATION : +32 2 764 19 42

SECRÉTARIATS : +32 2 764 19 49

+32 2 764 19 76

+32 2 764 19 45



Cliniques universitaires
SAINT-LUC
UCL BRUXELLES

SUIVEZ-NOUS SUR



COMMU-DSO-151-1.0
septembre 2018

Éditeur responsable : Thomas De Nayer / Service de communication
Photos : Shutterstock

Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 – 1200 Bruxelles
www.saintluc.be

© Cliniques universitaires Saint-Luc
Aucun élément de cette brochure ne peut être repris sans accord préalable



Cliniques universitaires
SAINT-LUC
UCL BRUXELLES

BROCHURE
À L'ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE



Qu'est-ce qu'un drainage d'une collection du sinus frontal par voie endoscopique et une intervention de Draf ?

Le diagnostic d'une collection du sinus frontal vient d'être effectué d'après les signes cliniques que vous présentez et le bilan radiologique qui a été réalisé. Cette atteinte est soit isolée, soit associée à l'atteinte d'un ou plusieurs autres sinus de la face. Elle doit bénéficier d'un geste de drainage du sinus.

Le but de ce drainage est double :

- diagnostique : ce geste permettra de confirmer la nature de la collection siégeant au niveau du sinus frontal et d'effectuer des prélèvements pour analyses ;
- thérapeutique : ce geste permettra d'évacuer la collection et ainsi de prévenir les complications.

En effet, en l'absence de traitement, la collection frontale peut diffuser aux régions voisines, à savoir l'œil et la cavité orbitaire, l'os frontal, les méninges, et induire des complications infectieuses graves.

En cas de sinusite frontale rebelle, une ouverture large des sinus frontaux (droit et gauche) s'effectue par voie endoscopique : opération dite de « Draf » du nom du chirurgien qui l'a codifiée.

Comment vous y préparer ?

N'oubliez pas de communiquer à votre chirurgien les traitements que vous prenez régulièrement, et en particulier Aspirine®, anticoagulants...

N'oubliez pas de signaler si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques, en particulier médicamenteuses.

Enfin, lors de l'hospitalisation, n'oubliez pas d'apporter les documents médicaux en votre possession : prises de sang ou examens radiologiques notamment.

L'intervention

Le geste chirurgical sera réalisé par voie endoscopique (voie naturelle). L'intervention consistera à ouvrir et drainer le sinus frontal en passant par la fosse nasale. Les instruments sont utilisés sous contrôle d'optiques lumineuses.

L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale. Pour améliorer la tolérance de l'examen, une anesthésie générale est souvent proposée et programmée. Le médecin-anesthésiste-réanimateur que vous verrez en consultation préalable à l'intervention répondra à vos questions relatives à sa spécialité.

Les soins post-opératoires et la durée d'hospitalisation vous seront précisés par votre chirurgien.

L'ouverture en un canal unique des deux sinus frontaux peut aussi se faire par voie endoscopique (opération de Draf).

Que se passe-t-il après l'intervention ?

Risques immédiats

L'hémorragie post-opératoire est habituellement bénigne. Elle peut, dans certains cas, nécessiter un geste local.

Risques secondaires

La formation de croûtes est habituelle et nécessite des soins locaux.

La cicatrisation endo-nasale peut aboutir à la formation d'adhérences ou synéchies au niveau de la fosse nasale, responsables d'une obstruction nasale.

Enfin, cette intervention ne met pas à l'abri d'une récurrence de la collection à l'intérieur du sinus.

Les complications liées à l'opération de Draf sont exceptionnellement : troubles de l'odorat, écoulement du liquide céphalo-rachidien, troubles oculaires.